

ET DE CANICROSS

Siège social : Les grands Rigauds 26270 MIRMANDE - France

Fédération délégataire et agréée par le Ministère des sports

president@ffstmushing.org

Affiliée au Comité National Olympique

Membre de l'IFSS (International Fédération of Seldog Sports)

## PROTOCOLE DE VACCINATION DES CHIENS PARTICIPANT À DES MANIFESTATIONS FFST

## Voici les recommandations:

## Pour le chiot :

Classiquement il était conseillé de vacciner les chiots dès 2 mois, avec 2 injections à un mois d'intervalle, puis de réaliser un rappel annuel toute la vie du chien pour l'ensemble des vaccins.

Récemment, le WSAVA (association vétérinaire mondiale des animaux de compagnie) a publié de nouvelles recommandations à l'attention des vétérinaires et des propriétaires de chien pour assurer une protection efficace des animaux contre les maladies infectieuses tout en réduisant le nombre de vaccins qui leur sont administrés régulièrement.

Le protocole suivant vous sera ainsi proposé en accord avec ces recommandations (protocole spécifique pour la vaccination antirabique) :

- Une vaccination possible dès 6-7 semaines des chiots pour les valences C, H, P (âge à adapter en fonction du risque de contamination de ces derniers, généralement le premier vaccin est réalisé vers 8 semaines), 8 semaines pour la leptospirose (et 12 semaines pour la rage).
- Des injections de primovaccination répétées toutes les 4 semaines jusqu'à ce que le chiot ait 16 semaines (4 mois) pour les valences C, H, P, et L : ainsi un chiot vacciné la première fois à 8 semaines devra recevoir au moins 3 injections.
- Un premier rappel après 6 mois à 1 an (3e injection de primovaccination).

<u>Pour les rappels : </u>

- Rage : De 1 à 3 ans selon prescriptions du fabricant du vaccin
- CHP: tous les 3 ans suffisent sauf épizootie
- L: une fois par an
- Pi (toux de chenil) : une fois par an

On peut donc concevoir que les gens vaccinent CHPLRPi une année, puis pendant deux ans simple rappel L et Pi, puis à nouveau CHPLRPi

C: Carré

H: hépatite de Rubarth

P: parvovirus L: leptospirose

Pi : toux de chenil (préconiser injectable, ou mixte nasal et oral

-le vaccin Zoetis sorti il y a deux ans.)

R : rage

Dominique Grandjean Vétérinaire Fédéral







